

Läkemedel som bör undvikas till äldre

Denna lista omfattar läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det. Det ska vidare finnas en välgrundad och aktuell orsak (indikation) för att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör också följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller. Kontakta förskrivande läkare för mer information.

Listan speglar indikatorn ”Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger” som ingår i rapporten Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen 2017-6-7). Följande läkemedel ingår (april 2023):

Långverkande bensodiazepiner

Är lugnande och sömngivande läkemedel

Diazemuls

Diazepam

Nitrazepam

Stesolid

Tramadol

Mot smärta

Dolatramyl

Gemadol

Nobligan

Tiparol

Tradolan

Tramadol

Propiomazin

Används vid sömnbesvär

Propavan

Propiomazin

Kodein

Mot smärta

Altermol

Citodon

Kodein

Panocod

Paracetamol/Kodein

Treo Comp

Glibenklamid

Ett diabetesmedel

Daonil

Glibenklamid

Läkemedel med antikolinerga effekter

Används t.ex. vid urininkontinens, som lugnande medel och i vissa preparat mot smärta

Akineton

Alimemazin

Amitriptylin

Anafranil

Atarax

Atropin

Buscopan

Calma

Clozapine

Detrusitol

Ditropan

Egazil

Emselex

Fesoterodine

Froidir

Glykopyrroniumbromid

Hydroxizin

Hydroxyzine

Kentera

Ketogan

Klomipramin

Leponex

Lergigan

Levomepromazine

Läkemedel med antikolinerga effekter (forts.)

Metylskopolamin

Morfin-Skopolamin

Norflex

Norgesic

Nozinan

Oxikodon-hyoscine

Oxybutynin

Pargitan

Postafen

Proklorperazin

Prometazin

Robinul

Rybrila

Saroten

Scopoderm

Sensaval

Sialanar

Solifenacin

Spasmofen

Tavegyl

Theralen

Tolterodin

TOVIAZ

Truxal

Vesicare